

## PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'AVISTAMENT, DETECCIÓ O PICADA DE LA VESPA ASIÀTICA (*Vespa velutina*)

### No ens confonguem... amb les vespes



La vespa velutina (*Vespa velutina nigrithorax*), d'origen asiàtic, és considerada una espècie exòtica invasora, per la seva incidència en la biodiversitat i els ecosistemes. Tot i que no és especialment perillosa per a les persones, si que ho és per a altres espècies d'animals, com ara les abelles de mel.

Durant els mesos de primavera i estiu, totes les vespes en general estan més actives. En el cas de la vespa velutina, les reines joves abandonen el niu a mitja tardor en busca d'un refugi per passar l'hivern. La resta de vespes i la reina vella moren.

### Aspectes bàsics que hem de conèixer:

- No són vespes assassines.
- No es més verinosa ni més agressiva cap a les persones que les vespes autòctones.
- Només ataquen si es troben amenaçades i, per això, es recomana mantenir-se a una distància prudencial del niu (a un 5 metres).
- Injecta la mateixa quantitat de verí que una abella comuna.

### Com identificar una vespa asiàtica:



La mida aproximada és de fins a tres cm (la resta d'himenòpters fa entre 2cm i 5 cm).

La part posterior del cap és de color fosc, però té la part dels ulls i la boca groga.

El tòrax és negre, tret d'una línia groga perfectament delimitada.

L'abdomen és marró, tot i que es torna d'un color groguenc-ataronjat en el segment final.

Les potes són grogues.



### **Que fer si ens trobem amb una vespa asiàtica:**

- Es recomana mantenir la calma, allunyar-se i no provocar-la, com faríem amb qualsevol tipus de vespa o abella.

### **Que s'ha de fer en cas d'atac?**

- S'ha de fugir ràpid sempre que es pugui i sense dubtar.

### **Com detectar un niu de vespa asiàtica:**



Hi ha dos tipus de nius, els primaris (més petits) i els secundaris (molt més grans, fins a 60 cm de diàmetre). La vespa asiàtica acostuma a construir-los a molta alçada, principalment als arbres. Per això no són gaire visibles. Tot i que no és habitual, també en podem trobar en altres indrets, com a terra o en edificis. Els nius estan formats per un material que recorda el paper maixé. Es reconeixen fàcilment perquè tenen formes de pera arrodonida amb un forat lateral d'entrada i sortida.

### **Avistaments i detecció:**

Cal seguir la recomanació general de no apropar-se i, sobretot, no manipular-lo.

- Per avistament i incidències:

#### **MOLT IMPORTANT**

**Sempre avisar al Cos d'Agents Rurals:**

**Tel. 935 617 000**



**[velutinacar@gencat.cat](mailto:velutinacar@gencat.cat)**



- En cas de detectar algun exemplar, no intentar capturar-lo per evitar el risc de picada que suposa.
- Només en el cas que es pugui, pot ser útil fer una fotografia de l'exemplar o niu i enviar-la per correu electrònic: [veluticar@gencat.cat](mailto:veluticar@gencat.cat).
- La persona que detecti un niu ha de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres.
- Si el niu és aeri i està a una alçada de 5 metres o superior s'ha de comunicar als Agents Rurals.
- Si el niu està a una alçada inferior a 5 metres o al terra, s'haurà de marcar amb una cinta de senyalització la zona perimetral de seguretat (5 metres de perímetre) i col·locar en lloc visible rètols de "**perill vesper**".
- En qualsevol dels dos supòsits s'haurà també de comunicar a la direcció del parc perquè ho comuniqui als responsables de guarderia i manteniment i és prenguin les mesures pertinents:
  - Guarderia vetllar per un seguiment i la comunicació als Agents Rurals
  - Manteniment preveure la senyalització de la zona de perill així com no realitzar treballs forestals dins l'entorn de seguretat.
- Cal incloure en el comunicat la ubicació concreta de l'exemplar o niu (vesper) indicant la localització (millor amb coordenades UTM), lloc o paratge concret, i el possible risc que s'observa.

Esquema i rètol de la senyalització:





Col·locació de cinta de senyalització

### Protocol en cas de picada:

Les picades fan molt malt per la mida gran del fibló, encara que no són més perilloses que les vespes autòctones. La majoria de persones atacades per les vespes asiàtiques presenten símptomes locals de dolor, vermellor i inflamació de la zona de penetració del verí, que desapareix després de varis dies.

En cas de picada:

- Rentar la zona de la picada amb aigua i sabó i apliqueu fred local.
- En el cas que es produeixi inflamació i envermelliment de la zona amb limitació funcional i dolor, aneu a qualsevol centre mèdic per rebre tractament.
- Si l'insecte us pica mentre treballeu, tindrà la consideració d'accident de treball i haureu d'anar al centre mèdic concertat de la mútua o dispensari laboral.
- Extremeu la precaució si sou al·lèrgics o hipersensibles a les picades d'himenòpters.
- A les persones al·lèrgiques poden aparèixer símptomes generals com picor a tot el cos, pujada de la temperatura corporal, baixada de la tensió arterial, problemes respiratoris, problemes cardiovasculars i altres símptomes greus.
- En cas necessari, sense perdre la calma però de forma urgent cal

### trucar a urgències 112

o anar el més aviat possible a un centre mèdic per rebre tractament adequat perquè aquests símptomes poden ser molt greus i poden conduir a xoc anafilàctic.

Juana Rosalia  
Barber Rosado -  
DNI 42071048T  
(AUT)

Signat digitalment  
per Juana Rosalia  
Barber Rosado - DNI  
42071048T (AUT)  
Data: 2021.06.04  
16:53:50 +02'00'

Revisió 03.06.2021